

Suivi pendant l'adolescence

Médecin traitant (généraliste/pédiatre)	Surveillance de la croissance, de la nutrition, du développement Dépistage des complications
Cardiologue	Suivi si anomalie : surveillance échographique et clinique en fonction des recommandations du spécialiste
Urologue et/ou néphrologue	Suivi si anomalie : surveillance échographique et biologique selon les recommandations du spécialiste
ORL	Suivi une fois par an et en fonction de la clinique : dépistage de la surdité, prise en charge des infections (otites, sinusites), bilan orthophonique
Ophtalmologiste	Suivi une fois par an : dépistage des troubles visuels, hygiène des paupières en prévention des blépharites
Gastro-entérologue	Suivi si anomalie : recherche de signes cliniques de reflux gastrique, examens complémentaires selon les recommandations du spécialiste, prise en charge des troubles du transit
Gynécologue	Contraception et suivi similaire à la population générale
Endocrinologue	Suivi si anomalie de croissance : suivi de la croissance, dépistage du retard pondéral ou statural, du retard pubertaire et du surpoids
Orthopédiste	Suivi si anomalie : recherche et surveillance de la scoliose, kinésithérapie motrice si besoin, appareillage selon les recommandations du spécialiste et en fonction des atteintes
Neuropédiatre ou neurologue	Suivi une fois par an jusqu'à 3 ans, puis au minimum aux âges clés qui sont 6-7 ans, 10-12 ans et 15-18 ans : évaluation des adaptations et aménagements à l'école et au domicile, évaluation neuropsychologique, recherche de troubles du sommeil, bilan orthophonique, évaluation et prise en charge paramédicale/rééducative en fonction des troubles au CAMPS/SESSAD/CMP EEG si suspicion d'épilepsie
Généticien ou pédiatre	Suivi une fois par an, coordination des soins
Pédopsychiatre	Recherche de troubles psychiatriques associés, dépistage d'un TSA, suivi psychologique Apparition de troubles du comportement (majorés par la douleur non exprimée ou par les troubles de la communication)
Dentiste	Suivi une fois par an (voire tous les 6 mois si le brossage est déficient), bilan orthodontique