

## Suivi clinique des enfants atteints du syndrome KBG, de 0 à 5 ans

De la naissance à 5 ans	Suivi médical	Évaluation	Suivi médical spécialisé	Suivi médical selon la symptomatologie, si besoin
Au diagnostic	consultation de pédiatrie initiale : examen clinique complet, recherche en particulier d'une fente labio-palatine, d'une cryptorchidie, d'une anomalie des hanches	bilan initial, échographie rénale, bilan kinésithérapique, ergothérapique, orthophonique et de psychomotrité	consultation en génétique, cardiologie (avec échographie + ECG), neuro-pédiatrie (avec EEG), ORL (avec tests audiologiques) et ophtalmologie	consultation en orthopédie, stomatologie, néphrologie, urologie
	ALD 100%, PAI / PPS / AVS si besoin, dossier MDPH, orientation CAMSP si nécessaire	IRM cérébrale et numération plaquettaire <b>si Del16q24.3</b>		
à 1 an	consultation de pédiatrie semestrielle	évaluation du développement, surveillance de la croissance	surveillance ORL, ophtalmologique et dentaire annuelle	consultation en cardiologie, neuro-pédiatrie, kinésithérapie, ergothérapie
à 2 ans	consultation de pédiatrie semestrielle	évaluation du développement, surveillance de la croissance	surveillance ORL, ophtalmologique et dentaire annuelle	consultation en cardiologie, neuro-pédiatrie, orthophonie, kinésithérapie, ergothérapie
à 3 ans	consultation de pédiatrie semestrielle	évaluation du développement, surveillance de la croissance	surveillance ORL, ophtalmologique et dentaire annuelle	consultation en cardiologie, neuro-pédiatrie, orthophonie, kinésithérapie, ergothérapie
à 4 ans	consultation de pédiatrie semestrielle	évaluation du développement, surveillance de la croissance	surveillance ORL, ophtalmologique et dentaire annuelle	consultation en cardiologie, neuro-pédiatrie, orthophonie, kinésithérapie, ergothérapie
à 5 ans	consultation de pédiatrie semestrielle	évaluation du développement, surveillance de la croissance	surveillance ORL, ophtalmologique et dentaire annuelle	consultation en cardiologie, neuro-pédiatrie, orthophonie, kinésithérapie, ergothérapie

Si infections ORL fréquentes : dosage pondéral des immunoglobulines et NFS

Faire des numérations plaquettaires annuelles en cas de **Del16q24.3**